

# AVERTISSEMENTS



DLP 19-04-91028834

# AGRICOLES

LORRAINE

## GRANDES CULTURES

Bulletin n° 8 du 17 avril 1991

### COLZA :

MELIGETHES : SURVEILLER LES SECTEURS TARDIFS

CHARANCONS DES SILIQUES : ATTENDRE

SCLEROTINIA : ATTENTION DANS LES SECTEURS  
PRECOSES

### ORGE :

1ER TRAITEMENT FONGICIDE

### BLE :

ATTENDRE LE STADE 2 NOEUDS

### MAIS :

UTILISATION DE L'ATRAZINE

### COLZA

Les colzas les plus avancés sont en début de floraison, les plus tardifs au stade boutons écartés.

Les prévisions météo (temps froid) ne devraient pas permettre un développement rapide de la végétation.

### SCLEROTINIA :

Intervenir juste avant la chute des premiers pétales avec un fongicide. Le temps sec actuel ne permet pas de contaminations. Le traitement ne devrait pas être réalisé avant la fin de la semaine dans les parcelles les plus précoces (variété Samourai).

### MELIGETHES :

Les températures chaudes ont entraîné un développement de ces insectes dans certains secteurs. Le seuil d'intervention de 2 méligèthes par pied au stade boutons écartés a été atteint dans les Vosges et dans le Nord de la Meuse et de la Moselle.

Continuer à surveiller vos parcelles.

Le colza n'est plus sensible à ce ravageur dès le début de la floraison.

240 F

**SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX**

38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51

7256  
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
DIRECTION RÉGIONALE  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT



ABONNEMENT ANNUEL

## CHARANCONS DES SILIQUES :

Les premières captures ont été enregistrées dans quelques parcelles précoces. Cet insecte cause des dégâts à partir du stade G2-G3 (premières siliques à 4 cm).

Surveiller vos parcelles. N'intervenir que si le seuil de 1 charançon pour 2 plantes est atteint.

A noter :

A partir de la floraison, en conditions poussantes, la durée d'action d'une pyréthrianoïde est limitée à 3 jours.

Ne faites pas de traitements inutiles qui devraient être renouvelés en cas d'infestation ultérieure.

## CEREALES

### Situation :

Les blés les plus avancés et les orges sont au stade 1 noeud.

Sur orge la rhynchosporiose a surtout progressé sur la base des plantes (F4 et F3) mais se développe également à l'aisselle de ces limbes.

Sur blé la septoriose n'intéresse encore que les feuilles basses (F4). Le temps actuel (froid et sec) lui est défavorable.

L'oïdium progresse dans les parcelles les plus sensibles (variétés Apollo et Arminda, végétation dense et semis précoces).

### Préconisations :

ORGE : Appliquer un 1er fongicide dès cette semaine dans toutes les parcelles arrivant au stade 1 noeud et n'ayant pas souffert de l'hiver ou d'attaques de virus (JNO - Mosaïque). Dans ces dernières différer ce traitement de quelques jours afin de ne faire qu'une application et limiter les frais.

BLE : Il est encore trop tôt pour intervenir même si l'oïdium est présente sur les parties basses de la plante. Attendre le stade 2 noeuds pour décider du traitement.

## MAIS

### ATRAZINE : RECOMMANDATIONS IMPERATIVES

Pour réduire au maximum les risques de contaminations des eaux superficielles (rivières, sources) et profondes (nappes phréatiques) par les résidus d'atrazine qui peuvent être entraînés par ruissellement ou lessivage, il est impératif de suivre les recommandations suivantes, tant pour la réalisation des traitements que pour le rinçage des pulvérisateurs et la destruction des emballages.



## MODALITES D'APPLICATION ET DOSES D'ATRAZINE SUR MAIS

Type de sol	Pente du sol	Incorporation avant semé	sur sol nu entre semis maïs et levées adventices	sur adventices levées
Sol avec plus de 5% de matière organique		Déconseillée		Conseillée 1 000
Sol avec moins de 5% de matière organique	Faible ou nulle	Conseillée 1 000-1 500	Déconseillée	Conseillée 750 - 1 000
	Forte	Conseillée 1 000-1 500		Possible avec précautions (*) 750 - 1 000

Doses d'atrazine : exprimées en g de matière active par hectare. Ne jamais dépasser la dose de 1 500 g de matière active par hectare et par an.

(\*) Possible avec précautions : c'est-à-dire sur couvert végétal suffisamment développé pour fixer un maximum d'atrazine.

## CODE DE BONNE UTILISATION DE L'ATRAZINE

-Ne jamais dépasser la dose maximale autorisée (avis du J.O. du 13/07/90) de 1500g de matière active par hectare et par an (3kg d'un produit formulé à 50%),soit en un seul traitement, soit au total de l'ensemble des traitements.

-Chaque fois que cela est possible, penser à réduire les doses à :

.1000 - 1250g lorsque l'atrazine est utilisée seule et incorporée au sol avant semis en succession céréalière, en terres franches, avec un faible enherbement (Nord, Bassin Parisien).

.1000 - 1200g lorsque l'atrazine est incorporée au sol avant semis et que son action est complétée avec celle d'un produit antigraminées spécifique (alachlore, métolachlore, EPTC, vernolate, etc...).

.750 - 1000g lorsque l'atrazine est appliquée sur adventices levées, soit en mélange avec de l'huile, soit associée à un produit antidicotylédones spécifique (pyridate, bentazone, etc...).

-Les traitements sur sol nu, entre le semis du maïs et la levée des adventices, sont à proscrire dans tous les cas pour éviter que l'atrazine soit entraînée dans les eaux superficielles par ruissellement lors de pluies abondantes.

Aussi les applications de pré-semis avec incorporation dans les premiers centimètres du sol par les dernières façons culturales, sont-elles à préférer. Grâce à la meilleure fixation de l'atrazine sur les argiles et la matière organique du sol, l'entraînement par ruissellement superficiel est ainsi évité.

- Sur adventices levées, l'atrazine doit être utilisée sur des plantes déjà développées. Dans les sols humifères ou dans les terres franches, non roulées, l'atrazine sera appliquée sur des adventices jeunes. Dans les sols battants ou en pente, le risque d'entraînement superficiel étant plus important, ces traitements seront réalisés sur des adventices plus développées afin d'obtenir une meilleure rétention du produit par la végétation.


- Ne jamais pulvériser de produit dans les ruisseaux et les points d'eau situés en bordures de champs. Une bande non traitée, d'une largeur de 3 à 10 m selon la pente et le vent, doit être réservée.

- Ultime précaution après le traitement : rincer les pulvérisateurs sur une zone neutre éloignée de toute source d'eau et en absence de vent.

7257



# EVOLUTION DES MALADIES DANS LES PARCELLES DE REFERENCES BLE



# EVOLUTION DES MALADIES DANS LES PARCELLES DE REFERENCES ORGE

